## 呕吐和排泄事件清理

## 所有食品店必须制定一套呕吐和腹泻事件的应对程序。

## 建议步骤:

- 1. 隔离区域。将员工、顾客及其他人员请离到呕吐/排泄事故区域 25 英尺外的位置。 帮助患病员工或顾客离开店内。
- 2. 清洁期间佩戴一次性手套。清理液体时,建议佩戴一次性口罩及(或)防护衣、 (或围裙)及鞋套。
- 3. 用一次性毛巾覆盖呕吐物/排泄物,防止其雾化进入空气。
- 4. 使用毛巾浸透/擦拭呕吐物/排泄物,然后丢入塑料垃圾袋中。
- 5. 使用氯漂白剂溶液(1 杯漂白剂混合 1 加仑水)或其他经 EPA 认证对诺如病毒有效的消毒剂。\* 注: 比一般消毒用的漂白剂溶液效果更强。
- 6. 将漂白剂溶液涂抹到受污染的表面区域,使之保持湿润至少10分钟。讓該區域自然風乾。(确保受影响区域通风良好。漂白溶液吸入或接触皮肤可能会有刺激性。)
- 7. 将所有手套、口罩和防护服(或围裙)丢到塑料袋中并立即丢弃。
- 8. 丟棄或特殊清洁和消毒用于清除呕吐物及(或)排泄物的工具和设备。
- 9. 丢弃该区域可能暴露的任何食品或一次物品及餐具。
- 10. 洗手! 可能的话, 最好洗澡并更换衣物。
- **11**. 记录该事件。以下信息必须记录在案:事件发生位置、日期和时间以及清理过程步骤。







